



# 子宮頸がんワクチン 無料接種できるわね

The Asahi Shimbun

**子宮頸がんワクチンとは**

<b>対象者</b>	<b>方法</b>
■小学6年～高校1年の女子	■計3回の筋肉注射
<b>効果</b>	
■がんに関連する2種類のウイルス感染を防ぐ	
■8～9年程度は効果が持続することが確認	
<b>副作用の例</b>	
■注射をした部分の痛みや発赤	■頭痛、発熱
	■嘔吐、下痢
	■失神

**子宮頸がんの発病者と死亡者数** 国立がん研究センター がん対策情報センター調べ

年齢 (歳)	発病者数 (2008年)	死亡者数 (2011年)
0	0	0
5	0	0
10	0	0
20	100	10
30	1200	50
40	1000	100
50	800	400
60	600	300
70	500	250
80	400	200

効果に限界はあるけどね。副作用を心配する声もあるよ

**ア** ウルさん 子宮頸がんワクチンが4月から定期接種となり、原則無料で受けられるようになったわね。

**A** そう。子宮頸がんは年間約9800人の女性がかかり、約2700人が亡くなり、約48万人が接種を受けた。確実に防げるの？

**ア** そうですね。原因となるウイルスの感染を、ワクチンは予防する効果がある。2010年11月から今年1月までに女子中高生のべ5

**A** いや、限界がある。子宮頸がんを起こすウイルスは約15種類あるが、ワクチンが効くのは2種類で、子宮頸がん全体の5～7割だ。だから、検診も受けて早期発見することが大切だよ。がんになる前には、子宮の粘膜に異常な細胞ができる。ワクチンはその細胞ができるのを防ぐ効果がある。ただ、ワクチンが使われて間がないので、患者が減るのか検証できるデータはまだ十分でない。

**A** 副作用を心配する声も上がっているそうね。

**A** ワクチンは2種類発売されているが、いずれも医療機関からの報告で1万人に1人程度、副作用が出ている。特に、注射の痛みや恐怖の原因とされる失神は他のワクチンより多い。

**A** 親には心配ね。

**A** 長期間休学するほどの重い副作用が出たと親たちが訴え、3月には被害者連絡会もできた。今月、厚生労働省の検討会でも被害が報告された。ワクチンとの因果関係はつきりせず、すぐに接種を中止する必要はないと判断されたが、同省は今後、本格的に調査する。

**A** 副作用らしい症状が出たらどうすればいい？

**A** まずは、接種した病院に相談を。医師が国に報告する。厚生省の検討会で因果関係について議論される。薬の安全対策などを担う医薬品医療機器総合機構に救済申請し、因果関係が認められれば、治療費など必要な費用が給付される仕組みもある。(森本未紀)

**A** 親には心配ね。

**A** 長期間休学するほどの重い副作用が出たと親たちが訴え、3月には被害者連絡会もできた。今月、厚生労働省の検討会でも被害が報告された。ワクチンとの因果関係はつきりせず、すぐに接種を中止する必要はないと判断されたが、同省は今後、本格的に調査する。

**A** 副作用らしい症状が出たらどうすればいい？

**A** まずは、接種した病院に相談を。医師が国に報告する。厚生省の検討会で因果関係について議論される。薬の安全対策などを担う医薬品医療機器総合機構に救済申請し、因果関係が認められれば、治療費など必要な費用が給付される仕組みもある。(森本未紀)